

| PARAMETR          | METODA                                      | WARTOŚĆ ŚRODKOWA           | ZAKRES                       |
|-------------------|---|----------------------------|------------------------------|
| APOLIPOPROTEINA B | IMMUNOTURBIDYMETRYCZNA                      | 1,20 g/l                   | 0,98 – 1,42                  |
|                   |   | 120 mg/dl                  | 98,4 – 142                   |
| CHOLESTEROL       | Z OKSYDAZĄ CHOLESTEROLU                     | 5,75 mmol/l<br>222 mg/dl   | 5,00 – 6,50<br>193 – 251     |
| HDL-CHOLESTEROL   | BEZPOŚREDNIA (II GENERACJA)                 | 1,18 mmol/l<br>45,5 mg/dl  | 1,00 – 1,36<br>38,7 – 52,3   |
|                   | WYTRĄCANIE / KWAS FOSFOROWOLFRAMOWY         | 0,790 mmol/l<br>30,5 mg/dl | 0,672 – 0,909<br>25,9 – 35,1 |
| LDL-CHOLESTEROL   | BEZPOŚREDNIA (II GENERACJA)                 | 3,42 mmol/l<br>132 mg/dl   | 2,91 – 3,93<br>112 – 151     |
| LIPOPROTEINA (a)  | IMMUNOTURBIDYMETRYCZNA                      | 21,2 mg/dl<br>45,3 nmol/l  | 17,0 – 25,4<br>36,2 – 54,4   |
| TRIGLICERYDY      | LIPAZA / GPO-PAP bez korekcji               | 2,38 mmol/l<br>211 mg/dl   | 2,00 – 2,76<br>177 – 245     |
|                   | LIPAZA / GPO-PAP bez korekcji (monoreagent) | 2,38 mmol/l<br>211 mg/dl   | 2,00 – 2,76<br>177 – 245     |

| PARAMETR          | METODA                                      | WARTOŚĆ ŚRODKOWA           | ZAKRES                       |
|-------------------|---|----------------------------|------------------------------|
| APOLIPOPROTEINA B | IMMUNOTURBIDYMETRYCZNA                      | 1,20 g/l                   | 0,98 – 1,42                  |
|                   |   | 120 mg/dl                  | 98,4 – 142                   |
| CHOLESTEROL       | Z OKSYDAZĄ CHOLESTEROLU                     | 5,75 mmol/l<br>222 mg/dl   | 5,00 – 6,50<br>193 – 251     |
| HDL-CHOLESTEROL   | BEZPOŚREDNIA (II GENERACJA)                 | 1,18 mmol/l<br>45,5 mg/dl  | 1,00 – 1,36<br>38,7 – 52,3   |
|                   | WYTRĄCANIE / KWAS FOSFOROWOLFRAMOWY         | 0,790 mmol/l<br>30,5 mg/dl | 0,672 – 0,909<br>25,9 – 35,1 |
| LDL-CHOLESTEROL   | BEZPOŚREDNIA (II GENERACJA)                 | 3,42 mmol/l<br>132 mg/dl   | 2,91 – 3,93<br>112 – 151     |
| LIPOPROTEINA (a)  | IMMUNOTURBIDYMETRYCZNA                      | 21,2 mg/dl<br>45,3 nmol/l  | 17,0 – 25,4<br>36,2 – 54,4   |
| TRIGLICERYDY      | LIPAZA / GPO-PAP bez korekcji               | 2,38 mmol/l<br>211 mg/dl   | 2,00 – 2,76<br>177 – 245     |
|                   | LIPAZA / GPO-PAP bez korekcji (monoreagent) | 2,38 mmol/l<br>211 mg/dl   | 2,00 – 2,76<br>177 – 245     |

| COMPONENT        | METHOD                                       | ASSIGNED VALUES            | RANGE                        |
|------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| APOLIPOPROTEIN B | IMMUNOTURBIDIMETRIC                          | 1.20 g/l                   | 0.98 – 1.42                  |
|                  |  | 120 mg/dl                  | 98.4 – 142                   |
| CHOLESTEROL      | CHOLESTEROL OXIDASE                          | 5.75 mmol/l                | 5.00 – 6.50                  |
|                  |  | 222 mg/dl                  | 193 – 251                    |
| HDL-CHOLESTEROL  | DIRECT (II GENERATION)                       | 1.18 mmol/l<br>45.5 mg/dl  | 1,00 – 1,36<br>38.7 – 52.3   |
|                  | PRECIPITATION / PHOSPHOTUNGSTIC ACID         | 0.790 mmol/l<br>30.5 mg/dl | 0.672 – 0.909<br>25.9 – 35.1 |
| LDL-CHOLESTEROL  | DIRECT (II GENERATION)                       | 3.42 mmol/l                | 2,91 – 3.93                  |
|                  |  | 132 mg/dl                  | 112 – 151                    |
| LIPOPROTEIN (a)  | IMMUNOTURBIDIMETRIC                          | 21.2 mg/dl                 | 17.0 – 25.4                  |
|                  |  | 45.3 nmol/l                | 36.2 – 54.4                  |
| TRIGLYCERIDES    | LIPASE / GPO-PAP no correction               | 2.38 mmol/l<br>211 mg/dl   | 2.00 – 2.76<br>177 – 245     |
|                  | LIPASE / GPO-PAP no correction (monoreagent) | 2.38 mmol/l<br>211 mg/dl   | 2.00 – 2.76<br>177 – 245     |

| COMPONENT        | METHOD                                       | ASSIGNED VALUES            | RANGE                        |
|------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| APOLIPOPROTEIN B | IMMUNOTURBIDIMETRIC                          | 1.20 g/l                   | 0.98 – 1.42                  |
|                  |  | 120 mg/dl                  | 98.4 – 142                   |
| CHOLESTEROL      | CHOLESTEROL OXIDASE                          | 5.75 mmol/l                | 5.00 – 6.50                  |
|                  |  | 222 mg/dl                  | 193 – 251                    |
| HDL-CHOLESTEROL  | DIRECT (II GENERATION)                       | 1.18 mmol/l<br>45.5 mg/dl  | 1,00 – 1,36<br>38.7 – 52.3   |
|                  | PRECIPITATION / PHOSPHOTUNGSTIC ACID         | 0.790 mmol/l<br>30.5 mg/dl | 0.672 – 0.909<br>25.9 – 35.1 |
| LDL-CHOLESTEROL  | DIRECT (II GENERATION)                       | 3.42 mmol/l                | 2,91 – 3.93                  |
|                  |  | 132 mg/dl                  | 112 – 151                    |
| LIPOPROTEIN (a)  | IMMUNOTURBIDIMETRIC                          | 21.2 mg/dl                 | 17.0 – 25.4                  |
|                  |  | 45.3 nmol/l                | 36.2 – 54.4                  |
| TRIGLYCERIDES    | LIPASE / GPO-PAP no correction               | 2.38 mmol/l<br>211 mg/dl   | 2.00 – 2.76<br>177 – 245     |
|                  | LIPASE / GPO-PAP no correction (monoreagent) | 2.38 mmol/l<br>211 mg/dl   | 2.00 – 2.76<br>177 – 245     |