

| PARAMETR | METODA | WARTOŚĆ ŚRODKOWA | ZAKRES |
|---------------------|---|------------------|--------------|
| APOLIPOPROTEINA A-1 | IMMUNOTURBIDYMETRYCZNA | 2,03 g/l | 1,66 – 2,40 |
| | | 203 mg/dl | 166 – 240 |
| APOLIPOPROTEINA B | IMMUNOTURBIDYMETRYCZNA | 1,74 g/l | 1,43 – 2,05 |
| | | 174 mg/dl | 143 – 205 |
| CHOLESTEROL | Z OKSYDAZĄ CHOLESTEROLU | 7,73 mmol/l | 6,73 – 8,73 |
| | | 298 mg/dl | 260 – 336 |
| HDL-CHOLESTEROL | WYTRĄCANIE / KWAS FOSFOROWOLFRAMOWY | 1,09 mmol/l | 0,763 – 1,42 |
| | | 42,1 mg/dl | 29,5 – 54,7 |
| LDL-CHOLESTEROL | BEZPOŚREDNIA, II GENERACJA | 1,59 mmol/l | 1,35 – 1,83 |
| | | 61,4 mg/dl | 52,1 – 70,7 |
| LIPOPROTEINA (a) | IMMUNOTURBIDYMETRYCZNA | 4,58 mmol/l | 3,89 – 5,26 |
| | | 177 mg/dl | 150 – 203 |
| TRIGLICERYDY | LIPAZA / GPO-PAP bez korekcji | 21,5 mg/dl | 17,2 – 25,8 |
| | | 48,3 nmol/l | 38,6 – 58,0 |
| TRIGLICERYDY | LIPAZA / GPO-PAP bez korekcji (monoreagent) | 3,96 mmol/l | 3,33 – 4,59 |
| | | 350 mg/dl | 295 – 405 |

| PARAMETR | METODA | WARTOŚĆ ŚRODKOWA | ZAKRES |
|---------------------|---|------------------|--------------|
| APOLIPOPROTEINA A-1 | IMMUNOTURBIDYMETRYCZNA | 2,03 g/l | 1,66 – 2,40 |
| | | 203 mg/dl | 166 – 240 |
| APOLIPOPROTEINA B | IMMUNOTURBIDYMETRYCZNA | 1,74 g/l | 1,43 – 2,05 |
| | | 174 mg/dl | 143 – 205 |
| CHOLESTEROL | Z OKSYDAZĄ CHOLESTEROLU | 7,73 mmol/l | 6,73 – 8,73 |
| | | 298 mg/dl | 260 – 336 |
| HDL-CHOLESTEROL | WYTRĄCANIE / KWAS FOSFOROWOLFRAMOWY | 1,09 mmol/l | 0,763 – 1,42 |
| | | 42,1 mg/dl | 29,5 – 54,7 |
| LDL-CHOLESTEROL | BEZPOŚREDNIA, II GENERACJA | 1,59 mmol/l | 1,35 – 1,83 |
| | | 61,4 mg/dl | 52,1 – 70,7 |
| LIPOPROTEINA (a) | IMMUNOTURBIDYMETRYCZNA | 4,58 mmol/l | 3,89 – 5,26 |
| | | 177 mg/dl | 150 – 203 |
| TRIGLICERYDY | LIPAZA / GPO-PAP bez korekcji | 21,5 mg/dl | 17,2 – 25,8 |
| | | 48,3 nmol/l | 38,6 – 58,0 |
| TRIGLICERYDY | LIPAZA / GPO-PAP bez korekcji (monoreagent) | 3,96 mmol/l | 3,33 – 4,59 |
| | | 350 mg/dl | 295 – 405 |

CORMAY LIPID CONTROL 2

Cat. No. 5-180

Lot: 707-2358B

Exp.: 2018-03

| COMPONENT | METHOD | ASSIGNED VALUES | RANGE |
|--------------------|--|-----------------|--------------|
| APOLIPOPROTEIN A-1 | IMMUNOTURBIDIMETRIC | 2.03 g/l | 1.66 – 2.40 |
| | | 203 mg/dl | 166 – 240 |
| APOLIPOPROTEIN B | IMMUNOTURBIDIMETRIC | 1.74 g/l | 1.43 – 2.05 |
| | | 174 mg/dl | 143 – 205 |
| CHOLESTEROL | CHOLESTEROL OXIDASE | 7.73 mmol/l | 6.73 – 8.73 |
| | | 298 mg/dl | 260 – 336 |
| HDL-CHOLESTEROL | PRECIPITATION / PHOSPHOTUNGSTIC ACID | 1.09 mmol/l | 0.763 – 1.42 |
| | | 42.1 mg/dl | 29.5 – 54.7 |
| LDL-CHOLESTEROL | DIRECT, II GENERATION | 1.59 mmol/l | 1.35 – 1.83 |
| | | 61.4 mg/dl | 52.1 – 70.7 |
| LIPOPROTEIN (a) | IMMUNOTURBIDIMETRIC | 21.5 mg/dl | 17.2 – 25.8 |
| | | 48.3 nmol/l | 38.6 – 58.0 |
| TRIGLYCERIDES | LIPASE / GPO-PAP no correction | 3.96 mmol/l | 3.33 – 4.59 |
| | | 350 mg/dl | 295 – 405 |
| TRIGLYCERIDES | LIPASE / GPO-PAP no correction (monoreagent) | 3.96 mmol/l | 3.33 – 4.59 |
| | | 350 mg/dl | 295 – 405 |

CORMAY LIPID CONTROL 2

Cat. No. 5-180

Lot: 707-2358B

Exp.: 2018-03

| COMPONENT | METHOD | ASSIGNED VALUES | RANGE |
|--------------------|--|-----------------|--------------|
| APOLIPOPROTEIN A-1 | IMMUNOTURBIDIMETRIC | 2.03 g/l | 1.66 – 2.40 |
| | | 203 mg/dl | 166 – 240 |
| APOLIPOPROTEIN B | IMMUNOTURBIDIMETRIC | 1.74 g/l | 1.43 – 2.05 |
| | | 174 mg/dl | 143 – 205 |
| CHOLESTEROL | CHOLESTEROL OXIDASE | 7.73 mmol/l | 6.73 – 8.73 |
| | | 298 mg/dl | 260 – 336 |
| HDL-CHOLESTEROL | PRECIPITATION / PHOSPHOTUNGSTIC ACID | 1.09 mmol/l | 0.763 – 1.42 |
| | | 42.1 mg/dl | 29.5 – 54.7 |
| LDL-CHOLESTEROL | DIRECT, II GENERATION | 1.59 mmol/l | 1.35 – 1.83 |
| | | 61.4 mg/dl | 52.1 – 70.7 |
| LIPOPROTEIN (a) | IMMUNOTURBIDIMETRIC | 21.5 mg/dl | 17.2 – 25.8 |
| | | 48.3 nmol/l | 38.6 – 58.0 |
| TRIGLYCERIDES | LIPASE / GPO-PAP no correction | 3.96 mmol/l | 3.33 – 4.59 |
| | | 350 mg/dl | 295 – 405 |
| TRIGLYCERIDES | LIPASE / GPO-PAP no correction (monoreagent) | 3.96 mmol/l | 3.33 – 4.59 |
| | | 350 mg/dl | 295 – 405 |